



Grandes  
Cultures

# Avertissements<sup>®</sup> Agricoles auvergne

DLP IMP 23-8-94077158

Bulletin technique N° 3 du 31/03/94  
Supplément N° 2

## COLZA

**Sclerotinia** : Intervenir au stade F1 - G1.

## ORGE D'HIVER

**Maladies** : Intervenir si nécessaire dès le stade 6.  
(Rhynchosporiose active)

## BLE

**Maladies** : Surveiller la Septoriose.

## COLZA

- Stades ( Boutons étalés - E  
) Début floraison - F1  
( Chute des premiers pétales G1 (localement).

## MALADIES

### ★ Situation

- PHOMA : Très fréquent sur feuilles basses.
- PSEUDOCERCOSPORELLA : Présence localisée avec légère progression.

### ★ Préconisation

Au stade F1 - G1 (chute des premiers pétales), il faut intervenir contre le *Sclerotinia* en préventif sur l'ensemble des parcelles de Colza. **Attention** : bien observer auparavant vos cultures afin de déceler la présence éventuelle de "Taches blanches" (*Pseudocercoporella*).

Choisir le fongicide adapté - Consulter la fiche jointe.

## MELIGETHES

Fin du risque dès le stade F1.

## ORGE D'HIVER

- Stades ( Redressement 5  
)  
( 1 Noeud - 6



Publication mensuelle  
Abonnement annuel : 230 Frs  
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.  
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional  
de la Protection des Végétaux  
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES  
Tél : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70

7109

## **MALADIES**

### ★ Situation

→ Rhynchosporiose et Helminthosporiose : Forte pression localement ; présence généralisée.

→ Rouille naine : Pustules fréquentes.

→ Oïdium : Forte variabilité selon la parcelle et la variété.

### ★ Préconisation

- *Intervenir dès le stade 1 noeud (6).*

- *Choisir le fongicide adapté (consulter le dépliant I.T.C.F. - S.P.V.).*

## **BLE**

( Redressement 5.  
Stades ) Epi à 1 cm.  
( 1 Noeud - 6.

## **MALADIES**

### ★ Situation

→ Piétin-verse : Les observations visuelles de ces derniers jours montrent la quasi absence de la maladie dans les secteurs réputés sensibles (Sologne et Bocage de l'Allier). Le risque est limité du fait du retard du semis à l'automne dernier (peu de semis d'Octobre).

→ Septoriose : C'est la maladie la plus fréquent, encore installée sur les feuilles âgées. La période sèche actuelle limite son évolution.

→ Rouille brune : Quelques pustules sur les feuilles anciennes (pas d'évolution).

→ Oïdium : Attaques limitées.

### ★ Préconisation

- *Secteurs à Piétin-verse : le risque est à priori faible (décalage des semis).*

- *Si une décision de traiter est prise avec un anti-piétin : il faut intervenir au stade 1 noeud (6) pour avoir une bonne efficacité (cas limités).*

- *Pour la maladie du feuillage comme la Septoriose : attendre le stade 2 noeuds (7) pour agir.*